

Η ωτοσκλήρυνση είναι μια πρωτοπαθής οστεοδυστροφία του κροταφικού οστού, η οποία προκαλεί προοδευτικά εξελισσόμενη απώλεια της ακοής. Η νόσος συνήθως συνοδεύεται από εμβοές των αυτιών και κρίσεις ίλιγγου που ποικίλουν σε χρονική συχνότητα και ένταση και αίσθημα πληρότητας του αυτιού. Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί στο ένα ή και στα δύο αυτιά.



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής

Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, Τηλ. 2741026631, 6944280764

Ιδιαίτερα Ενδιαφέροντα: Αντιμετώπιση βαρηκοίας από ωτοσκλήρυνση, εφαρμογές ακουστικών βαρηκοιών

pharmage@otenet.gr

Ωτοσκλήρυνση: Επιβεβαίωση της αποτελεσματικής δράσης του φθοριούχου νατρίου στην ωτοσκλήρυνση

Συντάχθηκε από τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 10:00



Αναστασία Α. Γκέλη, Κλινική Ακουσθιολογική Διαγνώστρις



Η αναστασία Α. Γκέλη, Κλινική Ακουσθιολογική Διαγνώστρις, είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην Ακουσθιολογία και Ακουστική Διαγνωστική. Η αναστασία Α. Γκέλη, Κλινική Ακουσθιολογική Διαγνώστρις, είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην Ακουσθιολογία και Ακουστική Διαγνωστική. Η αναστασία Α. Γκέλη, Κλινική Ακουσθιολογική Διαγνώστρις, είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην Ακουσθιολογία και Ακουστική Διαγνωστική.



Μηχανισμοί δράσης του Φθοριούχου Νατρίου στην Ωτοσκλήρυνση:

1. Αντιενζυματική δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της αντιενζυματικής δραστηριότητας κατά την απορρόφηση
2. Περιορισμός της οσμικής απορρόφησης
3. Μετατροπή των ωτοσπογγιωτικών ενεργών βλαβών σε πυκνότερες αδρανείς ωτοσκληρυντικές βλαβές
4. Αύξηση του οσμικού νεοσχηματισμού μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας.

[Πηγή: Εξελίξεις στην Οτορινολαρυγγολογία και Ωτολογία, Τεύχος 1, 2017, σελ. 10-12.](#)