

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 19:34

---

Πρόσφατες ανακοινώσεις συνδέουν την έλλειψη βιταμίνης D με αύξηση του κινδύνου πρόκλησης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και των επιπλοκών του . [1].



□ □ □

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης  
Ιατρός,  
Ωτορινολαρυγγολόγος,  
Οδοντίατρος,  
Διδάκτωρ της Ιατρικής  
Σχολής του Πανεπιστημίου  
Αθηνών  
Τηλ: 2744023768,  
0944280764, e-mail:  
pharmas@otenet.gr  
www.gelis.gr  
www.pharmas.gr  
www.gelentia.gr  
www.alteropedia.gr  
www.gelento.gr  
www.citumlin.gr  
www.gelentia.gr  
www.vitaminh12.gr  
www.zinc.gr  
www.gelimedicallexicon.  
gr  
www.gelipsicarcinoma.gr





Κάθε σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1000 IU (Διεθνείς Μονάδες) φυσικής βιταμίνης D3. Για τη δοσολογία του D3 Gkelin drops βλέπε: [www.pharmagel.gr](http://www.pharmagel.gr)

[illegible]