Untitled Document

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ή ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Οι αλλεργικές Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις εκδηλώνονται με συμπτώματα από τη μύτη (αλλεργική ρινίτιδα), τους παραρρίνιους κόλπους (ρινοκολπίτιδα), τα μέσα ώτα (καθ' υποτροπήν μέση ωτίτιδα), το λάρυγγα (καθ' υποτροπήν λαρυγγίτιδα), το στόμα (αλλεργική στοματίτιδα).

Οι ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις εκδηλώνονται σε ευαισθητοποιημένα σε διάφορα αλλεργιογόνα, ατοπικά άτομα. Ατοπικά άτομα χαρακτηρίζονται αυτά που συνθέτουν ειδικές ανοσοσφαιρίνες Ε (IgE) προς περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, τα οποία είναι συνήθως πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτεΐνες. Τα αλλεργιογόνα αυτά προέρχονται από αλλεργιογόνα ανεμόφιλα φυτά, τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού, επιθήλια οικόσιτων ζώων και διάφορες τροφές. (Tanabe, 2007).


Αλλεργιογόνα
ακάρι σκόνης σπιτιού
γύρη
Τοπική επαφή
με τον επιπεφυκότα
και ρινικό βλεννογόνο
Απελευθέρωση
των αλλεργικών
μεσολαβητών
προσταγλανδίνη D2
κύριος μεσολαβητής
ΙΣΤΑΜΙΝΗ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
• δακρύρροια
• ερύθημα
• οφθαλμικός
κνησμός

[redacted]



[redacted]

[redacted] Durham SR , Mirakian R , Jones NS , Leech SC , Farooque S , [redacted] peptides and immunotherapy. Curr Protein Pept Sci. 2007